



FARMA - CHEM SA

Τ.Θ. 1026 ΒΙ.ΠΕ.Θ. - Τ.Κ. 570 22 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ.: 2310 - 569 630 έως 33 FAX: 2310 - 797 047
<http://www.farmachem.gr>, e-mail: info@farmachem.gr

ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
AGRICHEM

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΠΡΟΪΟΝ:

SUPA MOLY®

**Συμπυκνωμένο εναιώρημα Μολυβδαινίου για την καλύτερη αξιοποίηση του
αζώτου και την ενίσχυση της παραγωγής χλωροφύλλης**

Εγγυημένη Σύθεση:

Μολυβδαίνιο (Mo) 25% β/ο ή 15,9% β/β

Λίπασμα Ε.Κ

Προέλευση: AGRICHEM Αυστραλίας

Αποκλειστική διάθεση για την Ελλάδα: FARMA - CHEM SA

Πλεονεκτήματα του Supra Moly®:

- 100% διαλυτά και διαθέσιμα θρεπτικά συστατικά για το φυτό για τη γρήγορη διόρθωση των ελλείψεων.
- Κατάλληλο για εδαφική και διαφυλλική εφαρμογή.
- Μπορεί να εφαρμοστεί μαζί με μεγάλη γκάμα αγροχημικών μειώνοντας έτσι τον αριθμό και το συνολικό κόστος των ψεκασμών.
- Η ειδική φόρμουλά του καθιστά πιο εύκολη τη διασπορά του μέσα στα ψεκαστικά υλικά και στις δεξαμενές ανάμειξης και άρδευσης.

Ο ρόλος του μολυβδαινίου:

Το Μολυβδαίνιο είναι απαραίτητο για τις χημικές μεταβολές που εμπλέκονται στην αφομοίωση του αζώτου, δηλαδή τη μετατροπή του νιτρικού σε αμμωνιακού μέσα στα φυτά. Συνεπώς, είναι σημαντικό για την παραγωγή χλωροφύλλης και τη λειτουργία πολλών ενζύμων.

Συμπτώματα τροφопενίας μολυβδαινίου:

- Νάνα φυτά.
- Κίτρινα φύλλα με νεκρωμένα μεσονεύρια διαστήματα
- Τα παλαιότερα φύλλα εμφανίζουν πρώτα τα συμπτώματα.
- Στο κουνουπίδι εμφανίζονται στενά ακανόνιστα κεντρικά φύλλα.
- Ανώμαλη συστρόφη μεσονεύριων σε άλλα σταυρανθή λαχανικά.
- χλώρωση των νεύρων στα ψυχανθή.
- Κακή καρπόδεση.

Περιέχει και Φώσφορο (P₂O₅) 16,3% β/β

Χαρακτηριστικά σκευάσματος:

Ειδικό βάρος: 1,55-1,59

Οδηγίες χρήσης: Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση.

Κατάλληλο για εφαρμογή: Διαφυλλικά, Υδρολίπανση.

Καλλιέργεια-Δόσεις-Τρόπος & Χρόνος εφαρμογής:

Γιγαρτόκαρπα, Πυρηνόκαρπα: Συνιστώνται 2 ψεκασμοί, στην πτώση των πετάλων και επανάληψη στις 10-15 ημέρες. Δόση: 20-30 κ.εκ./100 λίτρα νερό.

Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά Μανταρινιά, Γκρέϊπ φρουτ, Λεμονιά): Συνιστώνται 2 ψεκασμοί, α) στα 2/3 της ανοιξιάτικης βλάστησης και β) στην πτώση των πετάλων. Δόση: 20-30 κ.εκ./100 λίτρα νερό.

Αμπέλια (επιτραπέζια & οινοποιήσιμα): Διαφυλλικά με 20-40 κ.εκ. ανά στρέμμα ή 20-40 κ.εκ./100 λίτρα. Εφαρμόστε όταν οι βλαστοί έχουν μήκος 10 εκ. Επανάληψη 7-10 ημέρες αργότερα ή όπως απαιτείται για την αφομοίωση νιτρικών. Στην ποικιλία Merlot ψεκάστε 40 κ.εκ. ανά στρέμμα πριν την άνθιση για τη βελτίωση της καρπόδεσης.

Ελιά: Συνιστώνται 2 ψεκασμοί, α) πριν την έναρξη της άνθησης και β) στην καρπόδεση. Δόση: 20-30 κ.εκ./100 λίτρα νερό.

Ακτινίδιο: Συνιστώνται 2 ψεκασμοί, α) στην ανοιξιάτικη βλάστηση και β) στην πτώση των πετάλων. Δόση: 20-30 κ.εκ./100 λίτρα νερό.

Λάχανα, Μπρόκολο, Κουνουπίδι, Μαρούλι: Συνιστάται ψεκασμός στα 4-6 φύλλα με 10-20 κ.εκ. ανά στρέμμα. **Φρέσκα λάχανα:** με 10 κ.εκ. ανά στρέμμα. Εφαρμόστε στο 4^ο με 6^ο φύλλο. Επαναλαμβανόμενα μεσοδιαστήματα εφαρμογών σε 7-10 ημέρες ή όπως απαιτείται.

Τομάτες: Εφαρμόζεται όταν το φυτό είναι περίπου 10 έως 15 cm. Δόση: 20 κ.εκ. ανά στρέμμα.

Μεγάλης έκτασης καλλιέργειες (ελαιοκράμβη, σιτηρά): με 20 κ.εκ. ανά στρέμμα. Εφαρμόστε στο 3^ο με 5^ο φύλλο. Επανάληψη εφαρμογών όπως απαιτείται για τις περιοχές που παρουσιάζουν ανεπάρκεια.

Καρότα: με 20-40 κ.εκ. ανά στρέμμα. Εφαρμόστε στο 2^ο με 4^ο φύλλο. Επαναλαμβανόμενα μεσοδιαστήματα εφαρμογών σε 14 ημέρες ή όπως απαιτείται.

Κολοκυνθοειδή (Πεπόνι-Καρπούζι, Κολοκύθι): Εφαρμόστε στο 2^ο με 4^ο φύλλο. Επαναλαμβανόμενα μεσοδιαστήματα εφαρμογών σε 7-10 ημέρες ή όπως απαιτείται. Δόση: 20-40 κ.εκ. ανά στρέμμα.

Όσπρια: Εφαρμόστε στο 3^ο με 5^ο φύλλο. Επανάληψη εφαρμογών όπως απαιτείται για τις περιοχές που παρουσιάζουν ανεπάρκεια. Δόση: 20-40 κ.εκ. ανά στρέμμα.

Μηδική & Τριφύλλι: με 15-25 κ.εκ. ανά στρέμμα. **Νέα σπορά** - εφαρμόστε μόλις υπάρχει επαρκής κάλυψη φυλλώματος. **Εγκατεστημένη καλλιέργεια** - εφαρμόστε μετά από το 3^ο/4^ο κόψιμο.

Ηλιάνθος: Εφαρμόστε στο 4^ο με 6^ο φύλλο. Δόση: 20-40 κ.εκ. ανά στρέμμα.

Τομάτες: Εφαρμόζεται όταν το φυτό είναι περίπου 10 έως 15 cm. Δόση: 20 κ.εκ. ανά στρέμμα.

Σπορεία Κηπευτικών: με 2-4 κ.εκ. ανά 100 m². Εφαρμόστε σε θερμοκήπιο στο 2^ο φύλλο, περίπου 5 κ.εκ./1000 φυτά σε 5 λίτρα νερό.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην ψεκάσετε όταν οι μέλισσες είναι παρούσες.

Παρατηρήσεις:

-Οι προτεινόμενες δόσεις είναι καθαρά ενδεικτικές και μεταβάλλονται ανάλογα με την θερμοκρασία, την ηλιοφάνεια καθώς και από το εδαφικό pH.

- Σε διαφυλλικές εφαρμογές θα πρέπει να χρησιμοποιείται η ελάχιστη δόση όταν η θερμοκρασία και η ηλιοφάνεια βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα.